Prof. Edgar Lopategui Corsino
M.A., Fisiología del Ejercicio

PC1 U3-01: Prescripción de Ejercicio - Saludable: Parte 1 (60 puntos, 2 puntos c/u)

Nombre: _____ Núm. Est.: _____ Fecha: _____

Sección: _____ Hora de la Clase: _____ Días: _____

- C F 1. Según la ACSM (2014), en adultos, para la combinación de una *intensidad moderada y vigorosa*, se recomienda una *frecuencia* combinada de 3 a 5 veces por semana.
- C F 2. Según la ACSM (2014), para individuos con *patologías*, se recomienda que se ejerciten a una *intensidad moderada*, es decir, de 40-50% de la *frecuencia cardiaca máxima de reserva*.
- C F 3. La ACSM (2014) recomienda el entrenamiento *pliométrico* para adultos saludables.
- C F 4. Según la ACSM (2014), se espera un *efecto de acondicionamiento* en primeras 6-8 semanas.
- C F 5. La *sesión de relajamiento* (Ej: técnicas de meditación, visualización y otras), se realiza al final del enfriamiento.
- C F 6. Aumentar en el por ciento de intensidad, duración y frecuencia *según mejore* la capacidad aeróbica del individuo, se encuentra bajo el componente de progresión.
- C F 7. En la sesión de calentamiento, el pulso (frecuencia cardiaca) debe subir a los niveles determinados por la *fórmula de Karvonen* (*frecuencia cardiaca de entrenamiento*).
- C F 8. Según la ACSM (2014), para aquellos ejercicios aeróbicos que se efectúan a una intensidad *vigorosa*, se recomienda una *acumulación semanal* de 75 minutos o más.
- C F 9. La *intensidad* para *envejecientes de edad avanzada* debe ser $\leq 30\%$ de la *FCmáx-resv*.
- C F 10. Según la ACSM (2014), para aquellos individuos que posean *adecuadas destrezas motrices* y de aptitud física, se recomienda que participen en ejercicios y deportes que requieran altos niveles de capacidades motoras.
- C F 11. Según la ACSM (2014), para la *población obesa* que tiene como fin controlar su peso, se recomienda un MENOR volumen, en comparación con adultos saludables.
- C F 12. Según la ACSM (2014), para adultos que se ejercitan a una *intensidad vigorosa*, se recomienda entrenar de 60 a 89% de la *frecuencia cardiaca máxima de reserva*.
- C F 13. El propósito del *entrenamiento en intervalos*, es aumentar el volumen total.
- C F 14. Según la ACSM (2014), bajo el *Grupo-D*, el *baloncesto* es un deporte recreativo recomendado para *adultos* que participan en un programa de ejercicio regular.
- C F 15. Según la ACSM (2014), para aquellos adultos con una *pobre aptitud física*, se recomienda que se ejerciten a intensidad *de liviana a moderada*, es decir, de 30 a 40% de *FCmáx-resrv*.
- C F 16. Una *intensidad moderada* equivale aproximadamente de 12-13 en la escala de *Borg*.
- C F 17. Según la ACSM (2014), para adultos que se ejercitan a una *intensidad moderada*, se recomiendan ejercicios aeróbicos que recluten pequeños grupos musculares.
- C F 18. Según la ACSM (2014), para la *mayoría de los adultos*, se recomienda la práctica de ejercicio y deportes que requieran altos niveles de habilidades motoras.
- C F 19. Según la ACSM (2014), para la *población general*, se recomienda llevar a cabo *actividades aeróbicas* que requieran mínimas capacidades motoras (Ej: caminar).

- ___20. La **frecuencia cardiaca máxima** (FCmáx) se calcula mediante la siguiente ecuación:
a. $60 - 75\% + \text{Edad}$. b. $220 - 60 - 75 + \text{Edad}$. c. $220 - \text{Edad}$.
- ___21. Según la ACSM (2014), en adultos, la **frecuencia** para una **intensidad moderada** es:
a. 3 días/semana. b. 3 días/ semana. c. 5 días/semana.
- ___22. ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa el método de **Karvonen** utilizado para determinar la **frecuencia cardíaca de entrenamiento** (FCE)?:
a. $[(\text{FCrep} - 60\%) (\text{FCmáx})] + \text{FCrep}$
b. $[(40 \text{ a } 59\%) (\text{FCmáx} - \text{FCrep})] + \text{FCrep}$
c. $[(60 \text{ a } 75\%) (\text{FCrep} - \text{FCmáx})] + \text{FCrep}$
- ___23. El **método más común** para determinar la **intensidad** del ejercicio es utilizando:
a. Niveles séricos ácido carbónico. b. Cociente respiratorio c. Frecuencia cardiaca.
- ___24. Los dos lugares más **comunes** donde se pueden **palpar el pulso** son las arterias:
a. Radial y carótida. b. Cervical e inguinal. c. Temporal y axilar.
- ___25. El participante debe **reducir la intensidad** del ejercicio, o detenerse por completo, si:
a. No estiró. b. Experimenta dolor en el pecho. c. Calentó solo 10 minutos.
- ___26. Para estar seguro que el participante se encuentre dentro de su zona o **frecuencia cardiaca de entrenamiento**, éste debe:
a. Palpar (durante la fase aeróbica) en la arteria carótida o radial, el número de latidos durante 6 segundos y luego multiplicarlo por 10 (o añadirle un cero ["0"]).
b. Detenerse súbitamente, reclinarse en el suelo y contar el número de latidos en la arteria radial o carótida y luego multiplicarlo por 10.
c. Palpar la arteria femoral (sin ejercer mucha presión), luego registrar el número de latidos que se siente en 10 segundos y finalmente multiplicar el resultado por 7 para determinar el pulso de entrenamiento.
- ___27. Un individuo **obeso, mayor de 50 años** y que no acostumbra hacer ejercicio, debe ejercitarse (en sus comienzos del programa) a una intensidad que refleje el siguiente **por ciento de su frecuencia cardiaca máxima de reserva**:
a. 45 a 60 % b. 65 a 75 % c. 40 a 45 %
- ___28. Según la ACSM (2014), para la mayoría de los **adultos**, el **porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima de reserva** prescrito para una **intensidad moderada**, es:
a. 40 a 59 % b. 65 a 75 % c. 30 a 49 %
- ___29. Según la ACSM (2014), para la mayoría de los **adultos**, que realizan ejercicios de tipo **aeróbicos**, la **duración** acumulada diaria recomendada para una **intensidad vigorosa**, es:
a. 30 a 60 min b. 40 a 60 min c. 20 a 60 min
- ___30. Según la ACSM (2014), para la mayoría de los adultos, el **volumen** de un ejercicio realizado a una **intensidad moderada** debe ser aproximadamente:
a. 150 min/semana. b. 300 min/semana c. 120 min/semana.