

A man is swimming in clear, turquoise water. He is wearing a life preserver with yellow and red sections and dark sunglasses. He is looking towards the camera with a slight smile. His right arm is extended forward, and his left arm is also extended, creating splashes in the water. The water is bright and clear, with some ripples and small waves around him.

A man in a white tank top and red shorts is rowing a red boat on blue water, viewed from behind. The image has a decorative, pixelated border.



Saludmed 2013, por [Edgar Lopategui Corsino](#), se encuentra bajo una licencia "[Creative Commons](#)", de tipo: [Reconocimiento-NoComercial-Sin Obras Derivadas 3.0. Licencia de Puerto Rico](#). Basado en las páginas publicadas para el sitio Web: www.saludmed.com.




- Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



- ☐ El concepto de mito
- ☐ El problema del fraude en la salud
- ☐ Evidencias de las investigaciones científicas



icla...

A circular illustration of a muscular arm flexing, showing the bicep and forearm muscles. The arm is raised, with the hand clenched in a fist. The muscles are rendered in a realistic, shaded style. The background is a solid dark grey.

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



➤ **“alfabetización informacional”:**

- NOTA.** De: "Información fraudulenta sobre salud en internet", por: B. Castelló-Zamora, 2010, *El Profesional de la Información*, 19(3), 292-295. Recuperado de la base de datos de EBSCOhost (Academic Search Premier).



➤ **Fundamentos científicos:**

- ⇒ **Método científico:**

- ◇ ***¿Cuál es la pregunta?, o identificar el problema***
- ◇ ***Consultar literatura para contestar la pregunta***
- ◇ ***Si no se puede contestar, desarrollar una hipótesis***
- ◇ ***Comprobar la hipótesis mediante un experimento***
- ◇ ***Analizar los datos y derivar conclusiones***
- ◇ ***Comunicar los resultados:***

■ Revistas arbitradas (peer review journals)

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



- **Intuición**
- **Tradición**
- **Ensayo y error (*trial and error*)**
- **Predisposición (*bias*)**
- **Autoridad**
- **Racionalización (razonamiento)**
- **Método empírico**
- **El mito**


Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



➤ **Posibles raíces:**

- **Solución:**

- NOTA.** Adaptado de: *Exercise Physiology Integrating Theory and Application*. (p. 9), por W. J. Kraemer, S. J. Fleck, y M. R. Deschenes, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolte Kluwer business.



- **Determinar si es legítimo y si contenido provee:**
"Sobre Nosotros" (About Us), o secciones similares
- **Establecer si es precisa:**
 - ¿Las recomendaciones siguen las guías de ACSM?
 - ¿Recomienda consultar un médico antes del programa?
- **Observar si existe información sobre:**
los beneficios de actividad física?

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



MITOS DEL EJERCICIO:

Identificar Sitios-Web

Basados en Evidencia Científica

❑ Estrategias/Recomendaciones:

➤ Cotejar la presencia de los siguientes criterios:

- Seguimiento de actividad física
- Gráficas de actividad física
- Establecimiento de metas
- Programa de ejercicio individualizado



NOTA. Adaptado de: *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (p. 779), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine



➤ **Cotejar la presencia de los siguientes criterios:**

- NOTA.** Adaptado de: *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (p. 779), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine



- ☐ Metodología del entrenamiento deportivo
- ☐ Procesos de calentamiento y enfriamiento
- ☐ Hora del día para entrenar
- ☐ Leyendas que comprometen la salud



➤ **Efectuar 15 minutos de ejercicios aeróbicos, 3 veces a la semana es suficiente para mejorar el componente cardiorrespiratorio**

- **Guías de y ejercicio y actividad física:**
 - **Fundamentadas en evidencias científicas:**
 - ⇒ **Delineamientos:**
 - ◇ **ACSM: 2017**
 - ◇ **USDDHHS: 2008**
 - ◇ **OMS: 2010**

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO:
GUÍAS DE ACSM (2014)

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Modo : (Tipo de Ejercicio)	► Descripción: ● Para la mayoría de los adultos: ◆ Como mínimo - <i>Intensidad Moderada</i>: Ejercicios Aeróbicos Rítmicos Ejercicios utilizando grandes grupos musculares que se mantengan continuamente (por un periodo prolongado) y rítmicamente, y que sean de naturaleza aeróbica. ● Grupos musculares grandes ● Que requiera poca o ninguna destreza motriz ● Individuos que posean adecuadas destrezas motrices y de aptitud física: ◆ Recomendación: Práctica de otros tipos de ejercicios y deportes que requieran: ● Altos niveles de capacidades motoras ● Óptimos niveles de aptitud física

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Modo : ➤ <i>Ejemplos:</i> (Tipo de Ejercicio)	● Grupo A: ◆ Descripción: Actividades de Tolerancia Aeróbicas/Cardiorrespiratorias Solo requieren mínimas capacidades motoras/aptitud física ◆ Población indicada: Adultos en general ◆ Ejemplos: Caminar, ciclismo recreativo, ejercicios aeróbicos acuáticos, baile de baja intensidad ● Grupo B: ◆ Descripción: Actividades de Tolerancia Aeróbicas/Cardiorrespiratorias ● Intensidad vigorosa ● Solo requieren mínimas capacidades motoras/aptitud física ◆ Población indicada: Adultos ● Físicamente activos ● Capacidad promedio de la aptitud física ◆ Ejemplos: Trotar, correr, remo, ejercicios aeróbicos de <i>spinning</i>, ejercicios con máquinas elípticas, ejercicios aeróbicos de escalón, baile rápido

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; **Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription**. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.

Respiratorio en Adultos aparentemente Saludables

DOSIS

Actividad Aeróbicas/Cardiorrespiratorias

adecuadas

medio

Entrenamiento

Ejercicio regular

Campana (fútbol), esquí de cuesta abajo,

(pp. 162, 166-180), por American College of Sports
American College of Sports Medicine; **Resource**
5-479), por American College of Sports Medicine,
College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Intensidad : (%, absoluto)	► Descripción: ● Para la mayoría de los adultos - <i>Moderada a Vigorosa</i>: ◆ Moderada: ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima de reserva (%FC_{máx-resv}): 40 - 59% ● Por ciento del consumo de oxígeno de reserva (%VO_{2R}): 40 - 59% ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima (%FC_{máx}): 64 - 76% ● Por ciento del consumo de oxígeno máximo (%VO_{2máx}): 46 - 63% ● Escala de la percepción del esfuerzo (RPE), o Borg Scale: 12 - 13 ● Equivalencia metabólica (MET): 3 - 5.9 ◆ Vigorosa: ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima de reserva (%FC_{máx-resv}): 60 - 89% ● Por ciento del consumo de oxígeno de reserva (%VO_{2R}): 60 - 89% ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima (%FC_{máx}): 77 - 95% ● Por ciento del consumo de oxígeno máximo (%VO_{2máx}): 64 - 90% ● Escala de la percepción del esfuerzo (RPE), o Borg Scale: 14 - 17 ● Equivalencia metabólica (MET): 6 - 8.7

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Intensidad : (%, absoluto)	Descripción: ● Para los aquellos adultos con una pobre aptitud física - Liviana a Moderada: ◆ Liviana: ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima de reserva (%FC_{máx-resv}): 30 - 40% ● Por ciento del consumo de oxígeno de reserva (%VO₂R): 30 - 40% ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima (%FC_{máx}): 57 - 64% ● Por ciento del consumo de oxígeno máximo (%VO₂máx): 37 - 45% ● Escala de la percepción del esfuerzo (RPE), o Borg Scale: 9 - 11 ● Equivalencia metabólica (MET): 2 - 2.9 ● Individuos con patologías y envejecientes de edad avanzada - Muy Liviana a Liviana: ◆ Muy Liviana: ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima de reserva (%FC_{máx-resv}): ≤ 30% ● Por ciento del consumo de oxígeno de reserva (%VO₂R): ≤ 30% ● Por ciento de la frecuencia cardiaca máxima (%FC_{máx}): ≤ 57% ● Por ciento del consumo de oxígeno máximo (%VO₂máx): ≤ 37% ● Escala de la percepción del esfuerzo (RPE), o Borg Scale: ≤ 9 ● Equivalencia metabólica (MET): ≤ 2

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Intensidad : (%, absoluto)	► Recomendaciones: ● Entrenamiento en intervalos: ◆ Propósitos - <i>Durante las sesiones de ejercicio, aumentar:</i> ● Volumen total ● Intensidad promedio del ejercicio

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Duración : (minutos)	► Descripción: ● Para la mayoría de los adultos: ◆ Ejercicios aeróbicos continuos o discontinuos - <i>INTENSIDAD MODERADA</i>: ● Acumulación diaria: 30 - 60 minutos por día ● Acumulación semanal: ≥ 150 minutos por semana ◆ Ejercicios aeróbicos continuos o discontinuos - <i>INTENSIDAD VIGOROSA</i>: ● Acumulación diaria: 20 - 60 minutos por día ● Acumulación semanal: ≥ 75 minutos por semana ◆ Combinación - <i>INTENSIDAD MODERADA A VIGOROSA</i>: ● Acumulación diaria - <i>META</i>: Alcanzar los volúmenes prescritos para el ejercicio físico

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; **Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription**. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Duración : (minutos)	► Recomendaciones: ● Estrategias para acumular el tiempo del ejercicio: ◆ Una sola sesión de ejercicio continuo ◆ Entrenamiento en intervalo: <i>Cúmulo de sesiones cortas de ejercicios</i> ● PERIODOS o SESIONES de tiempo que definen a cada INTÉRVALO: ≥ 10 minutos a lo largo del día ● Duración del ejercicio - <i>Menor a lo recomendado:</i> ◆ Indicaciones - <i>Ciertas poblaciones:</i> ● Ejemplo: Participantes con claudicación intermitente

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: *GUÍAS DE ACSM (2014)*

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Frecuencia : (veces por semana)	► Descripción: ● Para la mayoría de los adultos: ◆ Intensidad MODERADA: 5 días por semana ◆ Intensidad VIGOROSA: 3 días por semana ◆ Intensidad MODERADA y VIGOROSA: ● Combinación semanal: 3 - 5 días por semana ► Excepciones: ● Para el caso de muy pocos individuos: "<i>Guerreros de fin de Semana</i>" ◆ 1 - 2 veces por semana: Esto no es recomendado para la mayoría de la población general adulta

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: ***GUÍAS DE ACSM (2014)***

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Volumen : (Trabajo Total Semanal)	► Descripción: ● Para la mayoría de los adultos ◆ Producto de la Frecuencia, Intensidad y Duración: ● META: $\geq 500 - 1,000$ METs por minuto por semana ($\text{METs} \cdot \text{min} \cdot \text{sem}^{-1}$) ● ACTIVIDAD FÍSICA de intensidad Moderada: $1,000$ kcal por semana ($\text{kcal} \cdot \text{sem}^{-1}$) ● EJERCICIO de intensidad Moderada: ~ 150 minutos por semana ($\text{min} \cdot \text{sem}^{-1}$) ● Conteo de pedómetros: $\geq 5,400 - 7,900$ pasos por día ($\text{pasos} \cdot \text{d}^{-1}$) Combinar con recomendaciones actuales concerniente a la duración del ejercicio ● Para los aquellos adultos con una pobre aptitud física: ◆ Recomendación: MENOR volumen que el regular ● Población obesa - <i>Control de peso</i>: ◆ Recomendación: MAYOR volumen que el regular


NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; **Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription**. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO: ***GUÍAS DE ACSM (2014)***

Tabla 12: La Dosis del Ejercicio para el Desarrollo de la Aptitud Cardiorrespiratoria en Adultos aparentemente Saludables

COMPONENTE	GUÍA O DOSIS
Progresión : (Ajuste de Variables)	► Descripción - Como resultado del efecto de acondicionamiento físico (primeras 6-8 semanas): ● Ajuste gradual para el volumen del ejercicio (trabajo total) por sesión: ◆ Aumentar en intensidad, duración, frecuencia o combinación de las tres: ● HASTA: donde sea tolerable por el individuo ● HASTA: que se cumpla con la meta - Mantenimiento ► Ventajas: ● Promueve la adherencia, o apego, al programa de ejercicio ● Disminuye los riesgos para: ◆ Lesiones musculoesqueléticas ◆ Emergencias médicas de tipo cardíaco

NOTA. Adaptado de: *Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (pp. 162, 166-180), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine; *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 7ma. ed.; (pp. 466-479), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine.



- ▶ **Moderada (3-5.9 METs):**
≥ 150 min/semana
- ▶ **Vigosa (≥ 6 METs):**
≥ 75 min/semana
- ▶ **Combinación:**
Moderada y Vigorosa



- ▶ **≥ 150 min/semana**
(Intensidad Moderada)
- ▶ **≥ 75 min/semana**
(Intensidad Vigorosa)
- ▶ **Beneficios Mayores:**
 - **≥ 300 min/semana**
(Intensidad Moderada)
 - **≥ 150 min/semana**
(Intensidad Vigorosa)

- ▶ Dispersado a lo largo de la semana
- ▶ Fortaleza Muscular: ≥ 2 días/semana



- ▶ **Actividades Físicas Diarias:**
Aeróbicas
- ▶ **Actividades para Desarrollo:**
Fortaleza Muscular





➤ **La mejor hora para efectuar los ejercicios es en la mañana**

➤ **Los beneficios de ejercicio se obtiene a cualquier:
hora del día que se entrena:**

- ⇒ **Ritmos circadianos:**



Review article

Circadian rhythms in exercise performance: Implications for hormonal and muscular adaptation

Weipeng Teo ¹✉, Michael J. Newton ¹ and Michael R. McGuigan ^{2,3}

¹ School of Exercise, Biomedical and Health Sciences, Edith Cowan University, Joondalup, Western Australia, ² New Zealand Academy of Sport North Island, Auckland, New Zealand, ³ Sport Performance Research Institute New Zealand, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand

Abstract

Almost all physiological and biochemical processes within the human body follow a circadian rhythm (CR). In humans, the suprachiasmatic nucleus regulates sleep-wake cycle and other daily biorhythms in line with solar time. Due to such daily physiological fluctuations, several investigations on neuromuscular performance have reported a distinct CR during exercise. Generally, peak performances have been found to occur in the early evening, at approximately the peak of core body temperature. The increase in core body temperature has been found to increase energy metabolism, improve muscle compliance and facilitate actin-myosin crossbridging. In addition, steroidal hormones such as testosterone (T) and cortisol (C) also display a clear CR. The role of T within the body is to maintain anabolism through the process of protein synthesis. By contrast, C plays a catabolic function and is involved in the response of stress. Due to the anabolic and catabolic nature of both T and C, it has been postulated that a causal relationship may exist between the CR of T and C and muscular performance. This review will therefore discuss the effects of CR on physical performance and its implications for training. Furthermore, this review will examine the impact of muscular performance on CR in hormonal responses and whether could variations in T and C be potentially beneficial for muscular adaptation.

Key words: Diurnal variation, steroidal hormones, neuromuscular adaptation.

tions of biological processes govern many of our habits and actions, and also influence the activities that we perform during the day. Many physiological functions associated with athletic performance have also been shown to follow a specific CR (Winget et al., 1985). Functions such as resting levels of sensorimotor, perceptual, and cognitive performance and several neuromuscular, behavioural, cardiovascular, and metabolic variables have been found to occur in the early evening, in line with peak body temperature rhythm (Cappaert, 1999).

Apart from diurnal variations in physiological systems, the preferential for daytime or nighttime activities is another important psychological factor that must be considered when studying CR in exercise performance. Such a concept has long been recognized with Kleitman (1949) documenting that some people have the consistent preference for daytime activities whilst others have the preference for nighttime activities. The contrasting time preference between individuals (commonly known as 'chronotypes') have been shown to differ in various physiological rhythms such as sleep-wake patterns, biorhythms (ie. core temperature and hormones), sleep inertia, food intake rhythms and maximal oxygen consumption during exercise (Baehr et al., 2000; Hill et al., 1988; Kerkhof, 1985). Due to the wide spectrum of morning-evening preferential, it is believed that this trait reflects the underlying



METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO

❑ Mito:

- Es más importante desarrollar la tolerancia cardiorrespiratoria, o aeróbica, que la aptitud muscular

❑ Realidad:

- El entrenamiento muscular ayuda al aeróbico:
 - Fundamentadas en evidencias científicas:
 - ⇒ Asisten en la salud ósea - *Prevención de osteoporosis*:
 - ⇒ Incorporadas en las guías de actividad física y ejercicio:
 - ◇ USDDHHS: 2008 ◇ AHA: 2007
 - ◇ ACSM: 2017

RECOMENDACIONES ACTUALES DE: *ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS*

Tabla 4: (continuación) Variables Fundamentales Involucradas en el Enfoque de la Actividad Física (Aeróbicas) y Desarrollo de la Aptitud Muscular para Adultos Saludables

COMPONENTE	RECOMENDACIÓN
Frecuencia : (minutos)	▶ Actividades físicas de naturaleza aeróbicas: ● Incorporación diaria de actividades físicas de tipo aeróbicas: ◆ Dispersadas a lo largo de la semana ▶ Actividades físicas dirigidas a desarrollar la fortaleza muscular: ● ≥ 2 días por semana ● Intensidad de estos tipos de actividades: Moderada o alta ● Músculos esqueléticos entrenados: Grupos musculares principales ● Series (sets): 1 - 3 ● Repeticiones: 8 - 12
Modo : (Tipo de Actividad Física)	▶ Actividades Físicas diarias: Aeróbicas ▶ Actividades para el desarrollo de la fortaleza muscular:

NOTA. Adaptado de: "2008 Physical Activity Guidelines for Americans", por: U. S. Department of Health and Human Services, 2008. Recuperado de <http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf>

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed


Population	Resistance Training		Flexibility Training	
	Sets; Reps	Stations/Devices*	Frequency	Goal
Healthy/sedentary adults				
2007 AHA Scientific Statement	1 set; 8–12 reps for persons <50–60 y of age; 10–15 reps at reduced levels of resistance for persons 50–60 y of age	8–10 exercises	2–3 d/wk	Stretching the major muscle or tendon groups, 2–3 d/wk
2006 ACSM Guidelines ¹¹⁰	1 set; 8–12 reps (range, 3–20 reps) performed at a moderate rep duration ($\approx$ 3 s concentric, $\approx$ 3 s eccentric)	8–10 exercises	2–3 nonconsecutive d/wk	Static stretching, major muscle tendon units a minimum of 2–3 d/wk; stretch to the ROM at a point of tightness, 15–30 s/stretch, 2–4 reps/stretch
Elderly persons				
2001 American Geriatrics Society ¹²¹	Low: 40% 1-RM; 10–15 reps Moderate: 40%–60% 1-RM; 8–10 reps High: >60% 1-RM; 6–8 reps	Not specified	2–3 d/wk	3–5 stretches/key muscle group; hold for 20–30 s; 3–5 d/wk
Cardiac patients				
2007 AHA Scientific Statement	1 set; 10–15 reps	8–10 exercises	2–3 d/wk	Stretching the major muscle or tendon groups, 2–3 d/wk
2004 AACVPR guidelines ¹¹¹	1 set; 12–15 reps	6–8 exercises	2–3 d/wk	
2006 ACSM guidelines ¹¹⁰	1 set; 10–15 reps	8–10 exercises	2–3 d/wk	

*Minimum 1 exercise per major muscle group, for example, chest press, shoulder press, triceps extension, biceps curl, pull-down (upper back), lower-back extension, abdominal crunch/curl-up, quadriceps extension or leg press, leg curls (hamstrings), and calf raise.

NOTA. Reproducido de: "Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. *Circulation*," por M. A. Williams, W. L. Haskell, P. A. Ades, E. A. Amsterdam, V. Bittner, B. A. Franklin, M. Gulianick, S. T. Laing, y K. J. Stewart, 2007, *Circulation*, **116**(5), p. 578. doi:10.1139/H10-079. Recuperado de <http://circ.ahajournals.org/content/116/5/572.full.pdf+html>

- Resistance training should be performed
 - In a rhythmical manner at a moderate to slow controlled speed
 - Through a full range of motion, avoiding breathholding and straining (Valsalva maneuver) by exhaling during the contraction or exertion phase of the lift and inhaling during the relaxation phase
 - Alternating between upper- and lower-body work to allow for adequate rest between exercises
- The initial resistance or weight load should
 - Allow for and be limited to 8–12 repetitions per set for healthy sedentary adults or 10–15 repetitions at a low level of resistance, for example, $<40\%$ of 1-RM, for older (>50 – 60 y of age), more frail persons, or cardiac patients
 - Be limited to a single set performed 2 d/wk
 - Involve the major muscle groups of the upper and lower extremities, eg, chest press, shoulder press, triceps extension, biceps curl, pull-down (upper back), lower-back extension, abdominal crunch/curl-up, quadriceps extension or leg press, leg curls (hamstrings), and calf raise

NOTA. Reproducido de: "Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. *Circulation*," por M. A. Williams, W. L. Haskell, P. A. Ades, E. A. Amsterdam, V. Bittner, B. A. Franklin, M. Gulanick, S. T. Laing, y K. J. Stewart, 2007, *Circulation*, **116**(5), p. 578. doi:10.1139/H10-079. Recuperado de <http://circ.ahajournals.org/content/116/5/572.full.pdf+html>




METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO

❑ Mito:

- El entrenamiento con resistencias disminuye la flexibilidad

❑ Realidad:

- Ausencia de ejercicios de flexibilidad:
Induce estos problemas de flexibilidad
 - Fundamentadas en evidencias científicas:
 - ⇒ Incrementar flexibilidad en algunas articulaciones:
 - ◇ Poblaciones sedentarias y envejecientes:
Con niveles iniciales bajos de flexibilidad



METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO

❑ Evidencias de Estudios Científicos:

➤ Entrenamiento con resistencias: *Conjuntamente con un regimen de flexibilidad*

• Efecto:

- ⇒ No altera el nivel inicial de flexibilidad
- ⇒ No inhibe el desarrollo de la flexibilidad



❏ Mito:

- **Ejercicios que pueden aumentar el arco de movimiento:**

- ⇒ **Sentadilla (squat)**
- ⇒ **Arranque (snatch)**
- ⇒ **Cargada de potencia (power clean) y**
- ⇒ **Sentadilla frontal (front squat)**
- ⇒ **Peso muerto con rodillas extendidas (stiff-leg deadlift)**
- ⇒ **Embestida (Lunge)**
- ⇒ **Otras**

RESISTANCE TRAINING AND DETRAINING EFFECTS ON FLEXIBILITY PERFORMANCE IN THE ELDERLY ARE INTENSITY-DEPENDENT

IOANNIS G. FATOUROS,¹ ANTONIOS KAMBAAS,¹ IOANNIS KATRABASAS,³ DIAMANDA LEONTISINI,¹ ATHANASIOS CHATZINIKOLAOU,¹ ATHANASIOS Z. JAMURTAS,² IOANNIS DOUROUDOS,¹ NIKOLAOS AGGELOUSIS,¹ AND KIRIAKOS TAXILDARIS¹

¹Physical Education and Sports Sciences Department, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece;

²Department of Physical Education and Sports Sciences, University Thessaly, Trikala, Greece; ³Metropolitan Hospital, Unit of Orthopaedics, Athens, Greece.

ABSTRACT. Fatouros, I.G., A. Kambas, I. Katrabasas, D. Leontisini, A. Chatzinikolaou, A.Z. Jamurtas, I. Douroudos, N. Aggelousis, and K. Taxildaris. Resistance training and detraining effects on flexibility performance in the elderly are intensity-dependent. *J. Strength Cond. Res.* 20(3):634–642, 2006.—The present investigation attempted to determine whether resistance exercise intensity affects flexibility and strength performance in the elderly following a 6-month resistance training and detraining period. Fifty-eight healthy, inactive older men (65–78 yrs) were randomly assigned to 1 of 4 groups: a control group (C, $n = 10$), a low-intensity resistance training group (LI, $n = 14$, 40% of 1 repetition maximum (1RM)), a moderate-intensity resistance training group (MI, $n = 12$, 60% of 1RM), or a high-intensity resistance training group (HI, $n = 14$, 80% of 1RM). Subjects in exercise groups followed a 3 days per week, whole-body (10 exercises, 3 sets per exercise) protocol for 24 weeks. Training was immediately followed by a 24-week detraining period. Strength (bench and leg press 1RM) and range of motion in trunk, elbow, knee, shoulder, and hip joints were measured at baseline and during training and detraining. Resistance training increased upper- (34% in LI, 48% in MI, and 75% in HI) and lower-body strength (38% in LI, 53% in MI, and 63% in HI) in an intensity-dependent manner. Flexibility demonstrated an intensity-dependent enhancement (3–12% in LI, 6–22% in MI, and 8–28% in HI). Detraining caused significant losses in strength (70–98% in LI, 44–50% in MI, and 27–29% in HI) and flexibility (90–110% in LI, 30–71% in MI, and 23–51% in HI) in an intensity-dependent manner. Results indicate that resistance training by itself improves flexibility in the aged. However, intensities greater than 60% of 1RM are more effective in producing flexibility gains, and strength improvement with resistance training is also intensity-dependent. Detraining seems to reverse training strength and flexibility gains in the elderly in an intensity-dependent manner.

KEY WORDS. flexibility, resistance training, detraining, elderly, strength

have been associated with muscle disuse and with soft tissue restraints such as collagen alterations, mechanical stress, disuse, and degenerative diseases (2), and are related to a deterioration of functional abilities (5, 17) and health status (17) of older individuals. This leads to dysfunction and inability to perform everyday activities such as getting up from a chair, walking, and climbing stairs (5). To the contrary, increasing muscular activity might slow the rate of flexibility loss in older adults (51) while improving several musculoskeletal disorders (43). Previous investigations have reported that older persons who maintain high levels of muscular strength and flexibility rarely participate in long-term health care programs (22).

Resistance training has been linked to significant improvement in health- and performance-related parameters in the elderly, such as muscle force, endurance, body composition, bone quality, postural stability, fall prevention, and quality of life (2, 12). However, there is limited information regarding strength training's effects on flexibility in the elderly. When weights were combined with stretching exercises, joints' passive range of motion was significantly enhanced (46). Most studies that examined the effects of training on flexibility have employed stretching exercises in their training protocol, making it difficult to distinguish the independent effects of resistance training on flexibility changes. Only 2 previous studies have examined the independent effects of resistance training on flexibility; these studies indicated that 16 weeks of weight training increased range of motion in several joints of older men, possibly because of an improvement in muscle strength after 16 weeks of training (3, 14). It has been suggested that resistance exercises enhance the tensile strength of tendons and ligaments,

INTERACTION BETWEEN RESISTANCE TRAINING AND FLEXIBILITY TRAINING IN HEALTHY YOUNG ADULTS

¹Department of Physiology and Pharmacology and Department of Physical Education, ²Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brazil.

KEY WORDS. physical training, range of motion, skeletal muscle, strength

Despite their practical relevance and potential interaction, there have been few systematic studies dealing with the combined effects of flexibility and resistance training (9, 10, 14, 15). Although these previous publications have provided relevant information, they presented methodological limitations, such as lack of control groups and evaluation of strength or flexibility of a limited number of movements. The present study involved 4 different groups of young volunteers in a longitudinal design, with the purpose of describing the interaction between resistance training and flexibility training. The tested hypothesis was that only limited cross-effects would occur between resistance and flexibility training, i.e., that increases in muscle strength and flexibility are developed only by specific training programs.

Experimental Approach to the Problem

The present study sought to determine the separate and



- **La Flexibilidad es principalmente genética, y muy poco desarrollo se espera mediante el entrenamiento**

➤ **Existen otros factores entrenables contribuyen:**
Mejora con el entrenamiento regular

- **Fundamentadas en evidencias científicas:**
 - ⇒ **Ejercicios crónicos de estiramiento estático - *6-12 semanas*:**
 - ◇ **Aumenta el arco de movimiento:**
 - **Por más de 10 grados, o**
 - **Por más de 18 %**

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

¹Exercise and Sport Science Department, Brigham Young University-Hawaii, Laie, HI; and ²Department of Kinesiology, Louisiana State University, Baton Rouge, LA

ABSTRACT

KOKKONEN, J., A. G. NELSON, C. ELDRIDGE, and J. B. WINCHESTER. Chronic Static Stretching Improves Exercise Performance. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 39, No. 10, pp. 1825–1831, 2007. **Purpose:** This study investigated the influence of static stretching exercises on specific exercise performances. **Methods:** Thirty-eight volunteers participated in this study. The stretching group (STR) consisted of 8 males and 11 females whose activity was limited to a 10-wk, 40-min, 3-d·wk⁻¹ static stretching routine designed to stretch all the major muscle groups in the lower extremity. The control group (CON) consisted of 8 males and 11 females who did not participate in any kind of regular exercise routine during the study. Each subject was measured before and after for flexibility, power (20-m sprint, standing long jump, vertical jump), strength (knee flexion and knee extension one-repetition maximum (1RM)), and strength endurance (number of repetitions at 60% of 1RM for both knee flexion and knee extension). **Results:** STR had significant average improvements ($P < 0.05$) for flexibility (18.1%), standing long jump (2.3%), vertical jump (6.7%), 20-m sprint (1.3%), knee flexion 1RM (15.3%), knee extension 1RM (32.4%), knee flexion endurance (30.4%) and knee extension endurance (28.5%). The control group showed no improvement. **Conclusion:** This study suggests that chronic static stretching exercises by themselves can improve specific exercise performances. It is possible that persons who are unable to participate in traditional strength training activities may be able to experience gains through stretching, which would allow them to transition into a more traditional exercise regimen. **Key Words:** LONG JUMP, MUSCLE STRENGTH, MUSCLE ENDURANCE, SPRINTING, VERTICAL JUMP FLEXIBILITY



The effects of stretching on the flexibility, muscle performance and functionality of institutionalized older women

D. Gallon^{1,2,5}, A.L.F. Rodacki², S.G. Hernandez³, B. Drabovski², T. Outi⁴,
L.R. Bittencourt³ and A.R.S. Gomes^{1,2}

¹Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal do Paraná, Matinhos, PR, Brasil

²Departamento de Educação Física e Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil

³Clínica do Atleta, Curitiba, PR, Brasil

⁴Asilo São Vicente de Paulo, Curitiba, PR, Brasil

⁵Departamento de Educação Física, Centro Universitário Franciscano, Curitiba, PR, Brasil

Abstract

Stretching has been widely used to increase the range of motion. We assessed the effects of a stretching program on muscle-tendon length, flexibility, torque, and activities of daily living of institutionalized older women. Inclusion/exclusion criteria were according to Mini-Mental State Examination (MMSE) (>13), Barthel Index (>13) and Lysholm Scoring Scale (>84). Seventeen 67 ± 9-year-old elderly women from a nursing home were divided into 2 groups at random: the control group (CG, N = 9) participated in enjoyable cultural activities; the stretching group (SG, N = 8) performed active stretching of hamstrings, 4 bouts of 1 min each. Both groups were supervised three times per week over a period of 8 weeks. Peak torque was assessed by an isokinetic method. Both groups were evaluated by a photogrammetric method to assess muscle-tendon length of uni- and biarticular hip flexors and hamstring flexibility. All measurements were analyzed before and after 8 weeks by two-way ANOVA with the level of significance set at 5%. Hamstring flexibility increased by 30% in the SG group compared to pre-training (76.5 ± 13.0° vs 59.5 ± 9.0°, P = 0.0002) and by 9.2% compared to the CG group (76.5 ± 13.0° vs 64.0 ± 12.0°, P = 0.0018). Muscle-tendon lengths of hip biarticular flexor muscles (124 ± 6.8° vs 118.3 ± 7.6°, 5.0 ± 7.0%, P = 0.031) and eccentric knee extensor peak torque were decreased in the CG group compared to pre-test values (-49.4 ± 16.8 vs -60.5 ± 18.9 Nm, -15.7 ± 20%, P = 0.048). The stretching program was sufficient to increase hamstring flexibility and a lack of stretching can cause reduction of muscle performance.

Key words: Homes for the aged; Muscle stretching exercises; Muscle strength; Flexibility; Activities of daily living

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO

❑ Mito:

- Hacer ejercicios con fiebre alivia la enfermedad

❑ Realidad:

- Los estados pirogénicos requieren reposo:
Puede acelerar la deshidratación y emergencias cardiacas
- Fundamentadas en evidencias científicas:
 - ⇒ Ejercicios agudos con fiebre:
 - ◇ Incrementa el estado de deshidratación
 - ◇ Aumenta el riesgo de:
 - Enfermedades relacionada con el calor:
 - ▶ Calambres ▶ Agotamiento ▶ Choque por calor



METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO

❑ Evitar hacer ejercicios estando enfermo:

➤ Algunas enfermedades puede:

- Causar deshidratación:

Reduce el volumen sanguíneo circulatorio

- Predisponen al individuo a:

Arritmias cardíacas

- Puede agravar otros problemas de salud

➤ Recomendaciones:

- Con ejercitarse cuando los individuos:

⇒ Se sienten enfermos

⇒ Perciben una fatiga poco usual


NOTA. Tomado de: “Design and Implementation of Exercise Training Regimens,” Por M. M. Dehn, & C. B. Mullins, 1984. En *Rehabilitation of the Coronary Patient*. 2da. ed., (p. 342), por N. K. Wenger, & H. K. Hellerstein (Eds.), 1984, New York: John Wiley & Sons. Copyright 1984 John Wiley & Sons, Inc.



Thermal Regulation

Condition

Rango de la Temperatura Interna y su Asociación con Enfermedades Vinculadas con el Calor o el Frío



NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance*. (p. 428), por S. A. Plowman, & D. L. Smith, 2011, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2011 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



- **Los músculos locales (Ej: multifido) pueden ser entrenados de forma independiente de los músculos globales (Ej: erectores de la espina)**

- **Todos los ejercicios para el tronco:**
 - **Involucran la activación de los grupos musculares:**
 - » Locales, y » Globales

- **Determinantes:**
 - » **Posición del cuerpo,** y » **Fuerza de gravedad**



ENTRENAMIENTO MÚSCULOS ESTABILIZADORES DEL NUCLEO (CORE)

❑ Mito:

- Existen ciertos músculos que son más importantes para la estabilización del núcleo, que otros (Ej: transverso abdominal)

❑ Realidad - *Evidencia Científica*:

- La estabilización del complejo lumbo-abdominal:
 - Se obtiene a través de:
 - ⇒ La activación coordinada de diversos músculos de la región media (core) del tronco:
 - ◇ No existe un grupo muscular mejor que otro:
 - Que contribuya más de 30% para la estabilidad del núcleo:
sin importar el tipo de ejercicio

**A PER
FOR C**

by Jeffrey M. Willardson, Ph.D.

LEARNING OBJECTIVES


- Understand the importance of core stability exercises for healthy individuals.
- Understand how to perform resistance exercises for the development of muscular endurance, muscular strength, and muscular power in the core musculature.
- Understand the potential advantages and disadvantages of performing resistance exercises on unstable equipment (*e.g.*, Swiss ball, wobble board, and balance disc).


Key words:

Resistance Training, Strength, Power, Muscular Endurance, Stability

For example, the squat is now commonly performed with each foot supported on a balance disc, and the chest press is now commonly performed while lying supine on a Swiss ball (5,6). The use of unstable equipment can make training fun and motivating and has been proven effective to increase core muscle activity. However, the use of this equipment does have limitations; for example, the lighter loads and lower movement velocities typical of exercises performed on unstable equipment make them best suited for development of core muscular endurance (7).

Development of this characteristic is beneficial for all individuals and may contribute to improvements in functional capacity, which allows for improved execution of most daily activities





Core Training Concepts for Performance Enhancement



Understand the importance of the core musculature and its relationship to performance enhancement.

Rationalize the importance of core training for improving sports performance and injury prevention.

Design a systematic core training program for athletes at any level of training.



➤ **Es obligatorio matricularte en un gimnasio,
o contratar un entrenador personal,
para poder lograr un nivel elevado de aptitud física**

- **Se puede iniciar con:**
 - » *Actividad físicas* » *Disminuir el tiempo sentado*
- **Fundamentadas en evidencias científicas:**
 - ⇒ **Guías de actividad física del 2008 - EJEMPLO: *Caminar* :**
- **Importante – Ser consistente:**
 - » *Actividad físicas* » *Ejercicios regulares*



CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

❑ Mito:

- Se debe estirar estáticamente antes de iniciar el estímulo del ejercicio

❑ Realidad:

- El estiramiento estático es más efectivo durante la fase de enfriamiento de la sesión de ejercicio:
 - Fundamentadas en evidencias científicas:
 - ⇒ El estiramiento estático agudo (> 60 segundos [60-90 s]):
 - ◇ Realizado durante la fase del enfriamiento:
 - ▣ Antes de un ejercicio físico o competencia deportiva:
 - ▶ Disminuye el rendimiento físico:
Fundamentado en pruebas de valoración



Efecto agudo del estiramiento sobre el rendimiento físico: el uso de los estiramientos en el calentamiento

Acute effect of stretching on physical performance:
the use of stretching exercises in warm-up

Francisco Ayala¹, Pilar Sainz de Baranda², Antonio Cejudo³, Mark de Ste Croix⁴

1 Facultad de Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia

2 Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Castilla-La Mancha

3 Centro deportivo INACUA

4 Faculty of Sports, Health and Social Care. University of Gloucestershire, Gloucester (United Kingdom)

CORRESPONDENCIA:

Francisco Ayala

Campus de los Jerónimos, s/n

30107 Guadalupe (Murcia)

fayala@pdi.ucam.edu

Recepción: julio 2010 • Aceptación: febrero 2011



Effect of Acute Static Stretch on Maximal Muscle Performance: A Systematic Review

ANTHONY D. KAY^{1,2} and ANTHONY J. BLAZEIVICH²

¹*Sport Exercise & Life Sciences, The University of Northampton, Northampton, UNITED KINGDOM;*
and ²*School of Exercise, Biomedical & Health Sciences, Edith Cowan University, Joondalup,*
Western Australia, AUSTRALIA

ABSTRACT

KAY, A. D., and A. J. BLAZEIVICH. Effect of Acute Static Stretch on Maximal Muscle Performance: A Systematic Review. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 44, No. 1, pp. 154–164, 2012. **Introduction:** The benefits of preexercise muscle stretching have been recently questioned after reports of significant poststretch reductions in force and power production. However, methodological issues and equivocal findings have prevented a clear consensus being reached. As no detailed systematic review exists, the literature describing responses to acute static muscle stretch was comprehensively examined. **Methods:** MEDLINE, ScienceDirect, SPORTDiscus, and Zetoc were searched with recursive reference checking. Selection criteria included randomized or quasi-randomized controlled trials and intervention-based trials published in peer-reviewed scientific journals examining the effect of an acute static stretch intervention on maximal muscular performance. **Results:** Searches revealed 4559 possible articles; 106 met the inclusion criteria. Study design was often poor because 30% of studies failed to provide appropriate reliability statistics. Clear evidence exists indicating that short-duration acute static stretch (<30 s) has no detrimental effect (pooled estimate = -1.1%), with overwhelming evidence that stretch durations of 30–45 s also imparted no significant effect (pooled estimate = -1.9%). A sigmoidal dose–response effect was evident between stretch duration and both the likelihood and magnitude of significant decrements, with a significant reduction likely to occur with stretches ≥ 60 s. This strong evidence for a dose–response effect was independent of performance task, contraction mode, or muscle group. Studies have only examined changes in eccentric strength when the stretch durations were >60 s, with limited evidence for an effect on eccentric strength. **Conclusions:** The detrimental effects of static stretch are mainly limited to longer durations (≥ 60 s), which may not be typically used during preexercise routines in clinical, healthy, or athletic populations. Shorter durations of stretch (<60 s) can be performed in a preexercise routine without compromising maximal muscle performance. **Key Words:** MUSCLE STRENGTH, WARM-UP, FORCE REDUCTION, PREPERFORMANCE STRETCH

© 2009 John Wiley & Sons A/S

SCANDINAVIAN JOURNAL OF
MEDICINE & SCIENCE
IN SPORTS

To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance

Nicholas Institute of Sports Medicine and Athletic Trauma, Lenox Hill Hospital, New York, New York, USA

Accepted for publication 5 October 2009

number of studies of varying quality have shown mixed results. A general consensus is that stretching in addition to warm-up does not affect the incidence of overuse injuries. There is evidence that pre-participation stretching reduces the incidence of muscle strains but there is clearly a need for further work. Future prospective randomized studies should use stretching interventions that are effective at decreasing passive resistance to stretch and assess effects on subsequent injury incidence in sports with a high prevalence of muscle strains.



BMJ 2002;325:468-70

Rob D Herbert, Michael Gabriel

Conclusions Stretching before or after exercising does not confer protection from muscle soreness. Stretching before exercising does not seem to confer a practically useful reduction in the risk of injury, but

Relevant studies were identified by searching Medline (1966 to February 2000), Embase (1988 to February 2000), CINAHL (1982 to January 2000), SPORTDiscus

Ian Shrier, MD, PhD

Because of the nature of research, we can never test actual competition performance with appropriate scientific rigor. Therefore, we rely on tests of performance that relate directly or indirectly to sport performance. The closer the test is to the performance required, the more relevant the test. For example, running speed over 50 m would be considered very relevant if the race distance interested in was 50 m, and less relevant if the race distance interested in was 1000 m. In addition, running speed in a race is dependent on force generated, speed of contraction, running economy, and psychology. Therefore, results from tests of only 1 of these (e.g., only force, only running economy) have to be interpreted with caution. That being said, some sports can often be categorized as a combination of single activities. In basketball, both speed and jump height are direct skills that affect the ability to perform, and in this case, results of performance tests become very relevant measures of



ce.gssiweb.com/Article_Detail.aspx?articleID=736



HOME

ABOUT GSSI

PUBLISHED RESEARCH

CONTINUING EDUCATION

User Option

[View/print PDF >](#)

[Email to a friend >](#)

Specific Topics

[Protein Nutrition and Endurance](#)

[Exercise: What](#)

[Does Science Say?](#)

[Continuing Education ACSM, NATA](#)

[& The USA](#)

[Cycling Coaching Assn](#)

[Meet our GSSI team](#)

Sports Science Library

SSE #104: Should Athletes Stretch Before Exercise?

Karl B. Field, MD; Craig M. Burnwoth, MD; Martha Delaney, MA

SHOULD ATHLETES STRETCH BEFORE EXERCISE?

Karl B. Fields, MD

Director of Family Medicine Residency and Sports Medicine Fellowship

Moses Cone Health System, Greensboro, NC

Professor and Associate Chairman

University of North Carolina Department of Family Medicine

Craig M. Burnworth, M.D.

Sports Medicine Fellow, Moses Cone Health System, Greensboro, NC

Associate Team Physician, Elon University, Elon, NC

Martha Delaney, M.A.


Administrative Director, Greensboro Area Health Education Center

Research Coordinator, Moses Cone Family Medicine Residency

Greensboro, NC



EFECTOS AGUDOS ADVERSOS DEL ESTIRAMIENTO ESTÁTICO: SOBRE LA EJECUTORIA FÍSICO-DEPORTIVA



➤ Impide la producción de la fuerza/potencia:

● Para las contracciones:
isométricas y concéntricas

➤ Isométricas

➤ Concéntricas

➤ Compromete la generación de una fuerza explosiva:

● Ejecutoria de los saltos:

➤ Medido por el:

■ Salto Vertical:

Prueba de potencia muscular

NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Performance*. 7ma. ed.; (p. 372), por W. D. McArdle, F. I. Katch, & V. I. Katch, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

A woman with dark hair is captured in mid-stride, running on a light-colored paved path. She is wearing a white athletic tank top, bright red shorts, white socks, and white sneakers. Her expression is focused, and her arms are in motion. The background is a lush green lawn with some trees, and the lighting suggests a bright, sunny day.

- ▶ **Disminuye el tiempo en:**

Carreras de velocidad:

 Medido por:

■ Evaluaciones anaeróbicas:

● **Tres pruebas rápidas de:**
20 metros cada una

➤ Reduce la actividad:

Electromiográfica, en los:

► **Músculos esqueléticos:**
Activos

EFFECTOS AGUDOS FAVORABLES DEL CALENTAMIENTO ACTIVO: *SOBRE LA EJECUTORIA FÍSICO-DEPORTIVA*



▶ Estimula activación:

● Función neuromuscular:

▶ Resultado:

■ Mejora generación:

● *Potencia muscular:*

✓ Incrementa efectividad:

➡ *Ejecutoria del:*

● *Ejercicio físico*

● *Destreza deportiva*



EFECTOS AGUDOS FAVORABLES DEL CALENTAMIENTO ACTIVO: SOBRE LA EJECUTORIA FÍSICO-DEPORTIVA



NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology: NIntegrating Theory and Application*. (p. 405), por W. J. Kraemer, S. J. Fleck, & M. R. Deschenes, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

➤ Facilita la fuerza explosiva:

🌀 Medido por:
Salto Vertical:


➤ Mejora ejecutorias:

🌀 Destrezas deportivas:

➤ Tennis de campo:

■ Servicio:
Velocidad en el servicio






Flexibility Training for Performance Enhancement



Perform and instruct appropriate flexibility techniques for given situations.

FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *CONTINUO: Tipos de Estiramientos*





NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 142), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Encucillado de Prisionero*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 142), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 142), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Rotación con Bola Medicinal*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Levantar Bola Medicinal y dejar Caer*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: "Lunge" Lateral con Alcanzar*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: "Lunge" de Viraje con Alcanzar*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Caminado con Banda Elástica*



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 143), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Escorpión*



© 2010 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the copyright owner. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 144), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: ***ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Encucillado una Pierna Tocar Abajo***




NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 144), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



FLEXIBILIDAD FUNCIONAL O INTEGRADA: ***ESTIRAMIENTO DINÁMICO: Oscilación Piernas, Frente y Atrás***



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 144), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



NOTA. Reproducido de: *NASM' Essentials of Sports Performance*. (p. 144), por M. A. Clark, & S. C. Lucett, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



AMERICAN COLLEGE
of SPORTS MEDICINE
www.acsm.org

ACSM's Foundations of **STRENGTH TRAINING AND CONDITIONING**



NICHOLAS RATAMESS



Wolters Kluwer
Health | Lippincott
Williams & Wilkins

10

Warm-Up and Flexibility

Objectives

- Discuss the physiological effects of a warm-up and the importance of warming up for injury prevention and performance enhancement
- Design general and specific warm-ups
- Discuss factors that affect flexibility
- Describe different modalities of stretching
- Discuss flexibility training guidelines and design a flexibility training program
- Discuss the importance of including a cooldown following a workout

General warm-up

Specific warm-up (sprinting)

Specific warm-up (leg workout)


Light to moderate sets of the squat



CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD:

CALENTAMIENTO: Continuo/Flujo

**** Potenciación Pos-Activación ****





➤ **Concepto:**

- ⇒ **En un arco de movimiento completo:**

NOTA. Adaptado de: *ACSM's Foundations of Strength Training and Conditioning*. (p. 170), por N. Ratamess, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por American College of Sports Medicine.



➤ **Caraterísticas:**


- ⇒ **Movimientos específicos:**

NOTA. Adaptado de: *ACSM's Foundations of Strength Training and Conditioning*. (p. 170), por N. Ratamess, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por American College of Sports Medicine.



CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO* ** Ejemplos **

❑ Círculos con los brazos, hacia al frente y hacia atrás:





CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO* ** Ejemplos **

❑ Círculos con el tronco, desde ahorcajadas:






CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD: *ESTIRAMIENTO DINÁMICO* ** Ejemplos **

❑ Caminata, levantando los rodillas:






CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD

❑ Estiramiento Dinámico:

➤ Elemento esencial para:

- El calentamiento, previo a un
 - ⇒ *Ejercicio físico, o*
 - ⇒ *Competencia deportiva*



CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD

❑ Estiramiento Dinámico:

➤ Ventajas/beneficios:

- Calentamiento simultaneo de:

⇒ Varios grupos musculares:

Incrementa la eficiencia del calentamiento



► **Indicaciones:**

⇒ **Regiones con alta tensión muscular, o sobreactivas:**

■ **Sostener: 20-30 segundos**

No afecta el rendimiento físico-deportivo



➤ **Indicaciones:**

- ### ◇ Duración para cada estiramiento estático:

► **Luego de un ejercicio aeróbico:**

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



► **Indicaciones:**

- ⇒ **Frecuencia – 3 a 5 veces por semana:**

■ Mayor capacidad absorber energía músculos esqueléticos:
Previene riesgo para lesiones

School of Human Movement and Exercise Science, University of Western Australia, Crawley, Western Australia, Australia

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



- ☐ El Ejercicio y la embarazada
- ☐ Entrenamiento con resistencias en mujeres
- ☐ Entrenamiento con resistencias en prepúberes
- ☐ Adaptaciones del ejercicio crónico sobre el sueño



EL EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO

❑ Mito:

- La mujer embarazada puede abortar su bebé si realiza ejercicios

❑ Realidad – *Evidencias Científicas:*

- Está indicado un programa de ejercicios para embarazadas
 - Se requiere seguir unas guías de precaución:
 - ⇒ American College of Obstetrics and Gynecology [ACOG]:
Exercise during Pregnancy and the Postpartum Period

ACOG

Committee on
Obstetric Practice

Reaffirmed 2009

This document reflects emerging clinical and scientific advances as of the date issued and is subject to change. The information should not be construed as dictating an exclusive course of treatment or procedure to be followed.

Copyright © January 2002 by the American College of Obstetricians and Gynecologists. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without

Committee Opinion



Number 267, January 2002

Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period

ABSTRACT: *The physiologic and morphologic changes of pregnancy may interfere with the ability to engage safely in some forms of physical activity. A woman's overall health, including obstetric and medical risks, should be evaluated before prescribing an exercise program. Generally, participation in a wide range of recreational activities appears to be safe during pregnancy; however, each sport should be reviewed individually for its potential risk, and activities with a high risk of falling or those with a high risk of abdominal trauma should be avoided during pregnancy. Scuba diving also should be avoided throughout pregnancy because the fetus is at an increased risk for decompression sickness during this activity. In the absence of either medical or obstetric complications, 30 minutes or more of moderate exercise a day on most, if not all, days of the week is recommended for pregnant women.*

Exercise During Pregnancy

With more than 30 years of active pregnant women from which to make a more educated opinion

Impact of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum on Chronic Disease Risk

In 1985, the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) provided recommendations for exercise during pregnancy that were conservative, based on limited evidence available at that time (4). For example, women were told not to perform intense activity continuously for more than 15 minutes per session, and limit their heart rate to 140 beats·min⁻¹. Following these original ACOG guidelines, research over the past 20 years has


**** Recomendaciones de Actividad Física ****

- **3 veces/semana:**
- ***Preferiblemente todos los días***

➤ **Moderada:**

- % VO₂R: **40 - 60%**
- Percepción del Esfuerzo: **12 - 14** (*en una escala de 6 al 20*)
- Prueba de hablar

❑ Tipo/Modo: *Actividad Aeróbica*



NOTA. Tomado de: *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (p. 567), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE EJERCICIOS: *MUJERES: EMBARAZADAS*

** Modificaciones de las Zonas para la FCE **

TABLE 36-2. Modified Heart Rate Target Zones for Moderate-Intensity Aerobic Exercise in Pregnancy Based on Maternal Age and Weight Status (Body Mass Index) (36,37,88)

BMI ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$)	Age (yr)	Fitness Level	HR Range (bpm)
<25	<20	Any	140–155
		Low	129–144
		Active	135–150
		Fit	145–160
	30–39	Low	128–144
		Active	130–145
≥ 25	30–39	Fit	140–156
	20–29	Any	102–124
	30–39	Any	101–120

NOTA. Tomado de: *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (p. 567), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine



ENTRENAMIENTO CON RESISTENCIAS EN MUJERES


❑ Mito:

- El entrenamiento con pesas en mujeres, resulta en el desarrollo de músculos grandes, lo cual induce una pérdida de su imagen femenina

❑ Realidad – *Evidencias Científicas:*

- La cantidad de testosterona no es suficiente para el desarrollo muscular marcado:
 - El promedio de los músculos de las mujeres *no ocasionan una hipertrofia excesiva*
 - ⇒ Circunferencias corporales:
 - ◇ No cambian ◇ Alteraciones reducidas
 - ⇒ Disminución en el tejido adiposo







ENTRENAMIENTO CON RESISTENCIAS EN PREPÚBERES

❑ Mito:

- El entrenamiento con pesas en niños, puede estancar el crecimiento lineal

❑ Realidad – *Evidencias Científicas:*

- El entrenamiento con resistencias en prepúberes:
Cuando se programa apropiadamente
 - Estimula la placa epifisaria
 - Incrementa la fortaleza muscular:
 - ⇒ Mecanismos:
 - ◇ Principalmente – *Adaptación neurológica*
 - ◇ Muy poca – *Hipertrofia muscular*

NOTA. Información de: "Strength Training Effects in Prepubescent Boys", por: J. A. Ramsay, C. J. R. Blimkie, K. Smith, S. Garner, J. MacDougall, & D. G. Sale, 1990, *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 22(5), 605-614.



ENTRENAMIENTO CON RESISTENCIAS EN PREPÚBERES

❑ Entrenamiento con resistencias en niños

➤ Desarrollo óseo - *Aumento en la Densidad Ósea: Estímulos para el remodelaje óseo*

- Estimula - *Aumento en:*

- ⇒ Tensión muscular
- ⇒ Frecuencia de la tensión
- ⇒ Compresión

NOTA. Información de: "Adaptive Responses of Bone to Physical Activity", por: B. P Conroy, W. J. Kraemer, C. M, Maresh, & G. P. Dalsky, 1992, *Medicine, Exercise, Nutrition, and Health*, 1(), 64-74.



ENTRENAMIENTO CON RESISTENCIAS EN PREPÚBERES

❑ Entrenamiento con resistencias – Pospúberes: *Inicios de la adolecencia*

➤ Adaptaciones musculares:

- Aumento en la fortaleza muscular, vía:


⇒ Hipertrofia muscular:

◇ Principalmente – *Cambios hormonales*:

■ Testosterona ■ Hormona de crecimiento

NOTA. Adaptado de: *Strength Training for Young Athletes: Safe and Effective Exercise for Performance*. 2da. ed., (pp. 15-16), por W. J. Kraemer, & S. J. Fleck, 2005, Champaign, IL: Human Kinetics. Copyright 2005 por William J. Kraemer and Steven J. Fleck.

OSIFICACIÓN ENDOCONDRAL DE LA TIBIA



© 2010 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110



erstanding permit.

SECOND EDITION

STRENGTH TRAINING FOR YOUNG ATHLETES



William J. Kraemer, PhD
Steven J. Fleck, PhD

TABLE 4-1 GUIDELINES FROM THE NATIONAL ASSOCIATION FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION


Infants	No minimum; encourage activity that develops motor skills.
Toddlers	1.5 hours; encourage 30 minutes of structured activity plus 60 minutes of unstructured activity.
Preschoolers	2 hours; encourage 60 minutes of structured activity plus 60 minutes of unstructured activity.
School-age children	≥1 hour; encourage bouts of activity lasting 15 minutes or more.

NOTA. Reproducido de: *Exercise for Special Populations*. (p. 99), por P. Williamson, 2011, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2011 por: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolte Kluwer business.

*** Recomendaciones de Actividad Física ***

-

NOTA. Tomado de: *Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 9na. ed.; (p. 569), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2014 por: American College of Sports Medicine





ADAPTACIONES DEL EJERCICIO CRÓNICO SOBRE EL SUEÑO

- **Las personas que realizan ejercicios con regularidad, requieren menos horas de sueño, en comparación con los individuos sedentarios**

- **El ejercicio crónico facilita el sueño:**
 - **Fundamentadas en evidencias científicas:**
 - ⇒ Los individuos que practican ejercicios con frecuencia:
 - ◇ **Inducen un efecto favorable para el sueño:**
en comparación con las personas inactivas
 - Se duermen:
 - ▶ Más rápido ▶ Por más tiempo, y ▶ Más profundo

1. Sleep-a basic understanding
2. Exercise- relevance and type
3. Sleep and exercise
4. Acute exercise studies
5. Chronic exercise studies
6. Possible mechanisms for the effects of exercise on sleep quality
7. Summary and conclusion
8. Future research
9. References



❑ Hallazgos Científicos:

➤ **El ejercicio:**

- **Mejora la calidad del sueño:**

Para todas las edades

➤ **Efectos del ejercicio crónico:**

- **Entrenamiento aeróbico y con resistencias:**

Mejora la calidad del sueño



➤ Efectos del ejercicio agudo:

- Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



➤ **Efectos del ejercicio crónico:**

⇒ **Dispone de un efecto moderadamente positivo:**

■ **En adultos de:**

- ▶ **Edad media, y:**
- ▶ **Adultos mayores (sobre 40 años de edad)**



- Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



➤ **Para perder peso (MC) hay que sudar mucho**

➤ **Se pierde MC al metabolizar más lípidos:**

- ⇒ **Las grasas como sustratos - Menor que 30% $VO_{2\text{máx}}$:**

- ♦ **Es más importantes crear un déficit calórico:**

1 lb grasa = 3500 calorías

- ⇒ **Perder líquidos resulta en deshidratación: 60% H_2O cuerpo:**

- ### ◆ Ocasiones problemas relacionados con el calor:

- Calambres ■ Agotamiento ■ Choque por calor



CONTROL DE PESO - DÉFICIT CALÓRICO

BALANCE ENERGÉTICO NEGATIVO



2000 kcal Ingeridas - 3000 kcal Gastadas = Reducción de MC

**Consumo
Calórico**



**Gasto
Calórico**




SUSTRATO ENERGÉTICO METABOLIZADO PREFERENCIA SEGÚN LA: *Intensidad del Ejercicio*

INTENSIDAD	COMBUSTIBLE METABÓLICO UTILIZADO
< 30% $\text{VO}_2\text{máx}$	Principalmente las Reservas Musculares de Grasa
40 - 60% $\text{VO}_2\text{máx}$	Se Utilizan Equitativamente las Grasas y los CHO
75% $\text{VO}_2\text{máx}$	Principalmente los CHO
80% $\text{VO}_2\text{máx}$	Cerca del 100% de los CHO

NOTA. Adaptado de: *The Sports Medicine Fitness Course*. (p. 141), por N. Ratamess, 1986, Palo Alto, CA: Bull Publishing Co.. Copyright 1986 por Bull Publishing Co.

UTILIZACIÓN RELATIVA DE LOS PRINCIPALES CUATRO SUSTRATOS: DURANTE UN EJERCICIO PROLONGADO: 65-75% del VO_2 máx



NOTA. Reproducido de: "Fuels for Sports Performance," por E. F. Coyle. En *Optimizing Sports Performance. Perspectives in Exercise Science and Sports Medicine*, Vol. 10. (p. 111), por D. R. Lamb, & R. Murray (Eds.), 1997, Carmel, IN: Cooper Publishing Group. Copyright 1997 por Cooper Publishing Group.



Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate

EDWARD F. COYLE, ANDREW R. COGGAN,
MARI K. HEMMERT, AND JOHN L. IVY

*Human Performance Laboratory, Department of Physical and Health Education,
University of Texas, Austin, Texas 78712*

COYLE, EDWARD F., ANDREW R. COGGAN, MARI K. HEMMERT, AND JOHN L. IVY. *Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate.* J. Appl. Physiol. 61(1): 165–172, 1986.—The purpose of this study was to determine whether the postponement of fatigue in subjects fed carbohydrate during prolonged strenuous exercise is associated with a slowing of muscle glycogen depletion. Seven endurance-trained cyclists exercised at $71 \pm 1\%$ of maximal O_2 consumption ($\dot{V}O_{2\max}$), to fatigue, while ingesting a flavored water solution (i.e., placebo) during one trial and while ingesting a glucose polymer solution (i.e., 2.0 g/kg at 20 min and 0.4 g/kg every 20 min thereafter) during another trial. Fatigue during the placebo trial occurred after 3.02 ± 0.19 h of exercise and was preceded by a decline ($P < 0.01$) in plasma glucose to 2.5 ± 0.5 mM and by a decline in the respiratory exchange ratio (i.e., R; from 0.85 to 0.80; $P < 0.05$). Glycogen within the vastus lateralis muscle declined at an average rate of 51.5 ± 5.4 mmol glucosyl units (GU) $\cdot$ kg $^{-1}$ $\cdot$ h $^{-1}$ during the first 2 h of exercise and at a slower rate ($P < 0.01$) of 23.0 ± 14.3 mmol GU $\cdot$ kg $^{-1}$ $\cdot$ h $^{-1}$ during the third and final hour. When fed carbohydrate, which maintained plasma glucose concentration (4.2–5.2 mM), the subjects exercised for an additional hour before fatiguing (4.02 ± 0.33 h; $P < 0.01$) and maintained their initial R (i.e., 0.86) and rate of carbohydrate oxidation throughout exercise. The pattern of muscle glycogen utilization, however, was not different during the first 3 h of exercise with the placebo or the carbohydrate feedings. The additional hour of exercise performed when fed carbohydrate was accomplished with little reliance on muscle glycogen (i.e., 5 mmol GU $\cdot$ kg $^{-1}$ $\cdot$ h $^{-1}$; NS) and without compromising carbohydrate oxidation. We conclude that when they are fed carbohydrate, highly trained endurance athletes are capable of oxidizing carbohydrate at relatively high rates from sources other than muscle glycogen during the latter stages of prolonged strenuous exercise and that this postpones fatigue.

endurance; physical performance; fatigue; glucose oxidation; athletes; diet

The purpose of this study was to directly measure muscle glycogen utilization during strenuous exercise with and without carbohydrate feedings to determine whether muscle glycogen sparing can explain the postponement of fatigue. Our first approach in the present study was simply to quantify glycogen utilization during 105 min of cycling when subjects were fed carbohydrates and when they fasted. After observing no difference in glycogen utilization during these nonfatiguing bouts of exercise, we proceeded to quantify glycogen utilization and carbohydrate oxidation during the latter stages of prolonged exercise performed to fatigue when subjects fasted and were fed carbohydrates.

METHODS

Initial Study of Glycogen Utilization During 105 min of Exercise With and Without Carbohydrate Feedings

Our first study measured glycogen utilization following 105 min of exercise at $71.4 \pm 0.8\%$ of maximal O_2 uptake ($\dot{V}O_{2\max}$) with and without carbohydrate feedings. These exercise trials employed a different group of five subjects, from the subsequent study described below, which exercised seven subjects to the point of fatigue. The specific methodology of this initial study is only briefly described at this point because it followed the same general procedures as employed during the first 105 min of exercise in the bouts performed to fatigue, which are described in detail below. The mean ($\pm$ SE) age, weight, and $\dot{V}O_{2\max}$ were 26 ± 2 yr, 71.9 ± 1.7 kg, and 4.67 ± 0.14 l/min, respectively, for this first group of five endurance-trained cyclists. The ordering of the carbohydrate and placebo trials was randomized in this first study and performed

113

Romijn, J. A., E. F. Coyle, L. S. Sidossis, A. Gastaldelli, J. F. Horowitz, E. Endert, and R. R. Wolfe.

mass spectrometry; stable isotopes; free fatty acids; muscle triglycerides; muscle glycogen


Central to achieving the aim of the present study, it was necessary to quantify fat and carbohydrate oxidation during high-intensity exercise. Indirect calorimetry has previously been thought to be inaccurate due to




COMPARTIMIENTOS DE LÍQUIDOS EN EL CUERPO

DISTRIBUCIÓN: Extracelular e Intracelular

COMPARTIMIENTO DEL LÍQUIDO EXTRACELULAR



COMPARTIMIENTO DEL LÍQUIDO INTRACELULAR






COMPARTIMIENTOS DE LÍQUIDOS EN EL CUERPO

RELACIÓN: Masa Corporal y Agua

RELACIÓN ENTRE MASA CORPORAL Y AGUA



Modelo de Cinco Compartimientos


COMPARTIMIENTOS/LÍQUIDOS DEL CUERPO
(60% de la Masa Corporal es Agua)

Citoplasma
(Célula Normal)
Sarcoplasma
(Célula Muscular)


LÍQUIDO EXTRACELULAR
(Fuera de las Células)

LÍQUIDO INTRACELULAR
(Dentro de las Células)

Plasma
(Porción Líquida Sangre)





Líquido INTERSTICIAL/TISULAR
(Entre Células/Tejidos)



Líquido TRANSCELULAR


- Líquido Cerebroespinal (encefaloaraquídeo)
- Líquido Secreciones Sistema Gastro-Intestinal
- Líquido Sinovial
- Líquido Pleural
- Líquido Intra-Ocular
- Líquido Peritoneal





LÍQUIDOS EN EL CUERPO

EQUILIBRIO HÍDRICO: Absorción y Eliminación





EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE: LÍQUIDOS/AGUA Y ELETRÓLITOS


**** Pérdida de Líquidos ****



- ☐ **Pérdida de 1% de la Masa Corporal (MC, o Peso):**
 - **Disminución en el tiempo de reflejo**
 - **Reducción en la fortaleza muscular**
 - **Algunos trastornos en el tiempo de reflejo**
- ☐ **Pérdida de 3% de la Masa Corporal (MC, o Peso):**
 - **Aumento en la frecuencia cardiaca**
 - **Incremento en la temperatura rectal**
 - **Disminución en el estado de alerta mental**
 - **Reducción en la respuesta de los reflejos**
- ☐ **Pérdidas adicionales de líquidos:**
 - **Agotamiento por calor**
 - **Choque por calor**



EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE: *LÍQUIDOS/AGUA Y ELETRÓLITOS* ** Pérdida de Líquidos **






LÍQUIDOS Y ELECTRÓLITOS


REPOSICIÓN DEL AGUA Y ELECTRÓLITOS:

Prueba para Determinar el Estado de Deshidratación



Prueba para Determinar el Estado de Deshidratación: Escala de Armstrong

Fecha	MC1 MC sin Ropa del día Anterior (kg)	MC2 MC sin Ropa de este día (kg)	MC1 - MC2 Diferencia entre las MC (kg)	¿Tienes Sed? (Sí/No)	COLOR DE LA ORINA según la Escala de Armstrong



1 - 3 = Bien Hidratado

4 - 6 = Leve a Moderadamente Desidratado

7 ó más oscuro = Bien Deshidratado

NOTA. Reproducido de: *Performing in Extreme Environments*. (p.), por L. E. Armstrong, 2000, Champaignn, IL: Human Kinetics. Copyright 2012 por AL. E. Armstrong.

LÍQUIDOS Y ELECTRÓLITOS

REPOSICIÓN DEL AGUA Y ELECTRÓLITOS:

Métodos para Evaluar el Estado de Hidratación: En el Campo

Table 9-2. Hydration Status: Body Mass and Urine Color Indices

Hydration	% Body Mass Change	Urine Color
Well hydrated	± 1	1 or 2
Minimal dehydration	-1 to -3	3 or 4
Significant dehydration	-3 to -5	5 or 6
Serious dehydration	Greater than -5	Greater than 6

NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology Integrating Theory and Application*. (p. 285), por W. J. Kraemer, S. J. Fleck, y M. R. Deschenes, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolte Kluwer business.

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Después Competencia



- Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed




LÍQUIDOS Y ELECTRÓLITOS

REPOSICIÓN DEL AGUA Y ELECTRÓLITOS: Recomendaciones


TOMANDO AGUA Y BEBIDAS DEPORTIVAS

2 horas antes del juego:




2 vasos de 8 onzas

Por cada hora de juego:




1 a 1½ de litros de agua

Cada 15 minutos durante el juego:




½ a 1 vaso de agua



TOMANDO AGUA Y BEBIDAS DEPORTIVAS - Después del Ejercicio:



Pesarse



Por cada libra que pierdas



Tomar 16 onzas de agua



➤ **Los abdominales son efectivos para reducir la grasa abdominal**

➤ **El cuerpo no discrimina por región de las reservas:**

- ◆ **Tonifica músculos en el área:**

Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed

Adipose tissue
12,000 g (108,000 kCal)


Plasma FFA
0.4 g (3.6 kCal)

Plasma triacylglycerols
4.0 g (36 kCal)

Intramuscular triacylglycerols
300 g (2700 kCal)

Total Fat
12,304 g (110,740 kCal)


NOTA. Reproducido de: *Sports and Exercise Nutrition*. 7th. ed.; (p. 27), por W. D. McArdle, F. I. Katch, & V. I. Katch, 2010, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2010 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.







LÍPIDOS - RESERVAS EN EL CUERPO

EL ADIPOSITO HUMANO: Célula de Grasa








La Ecuación

del

Balance

Energético



3000 kcal Ingeridas - 3000 kcal Gastadas = Sin Cambios de MC

Consumo
Calórico



Gasto
Calórico

EQUILIBRIO CALÓRICO



2000 kcal Ingeridas - 3000 kcal Gastadas = Reducción de MC

Consumo
Calórico



Gasto
Calórico

EQUILIBRIO CALÓRICO NEGATIVO





4000 kcal Ingeridas - 2000 kcal Gastadas = Aumento de MC

Consumo
Calórico



Gasto
Calórico

EQUILIBRIO CALÓRICO POSITIVO



NOTA. Reproducido de: *Sports and Exercise Nutrition*. 4ta. ed.; (pp. 213, 157), por W. D. McArdle, F. I. Katch, & V. I. Katch, 2013, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2013 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



➤ **El ejercicio quema muchas calorías**

➤ **El cuerpo es económico en términos metabólicos:**


- ⇒ **30 minutos de ejercicios moderados:**

⇒ **Alternativa para el control de peso a largo plazo:**

◇ **Disminuir el consumo energético de los alimentos:**

Sólidos y líquidos


Diario




CONTROL DE PESO

GASTO ENERGÉTICO: Sedentario vs. Activo

Thermogenesis, 10%



Sedentary Individual



Active Individual

NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance*. (p. 220), por S. A. Plowman, & D. L. Smith, 2011, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2011 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.




- **Después del ejercicio, el metabolismo se acelera todo el día, quemando un gran número de calorías adicionales**

➤ **El cuerpo gasta poca energía posterior al ejercicio:**

- ⇒ **La opción real es disminuir el contenido de lípidos:**
Controlar la ingesta de alimentos altos en calorías




DÉFICIT DE OXÍGENO, ESTADO ESPABLE Y COEP: CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO






CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O_2 Normalmente Consumido en Reposo






CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O_2 Normalmente Consumido en Reposo * CAUSAS *





CONSUMO DE OXÍGENO EN EXCESO POSTERIOR AL EJERCICIO (COEP) *OXÍGENO DE RECUPERACIÓN: Exceso O_2 Normalmente Consumido en Reposo* *** CAUSAS ***



NOTA. Reproducido de: *Exercise Physiology: Integrating Theory and Application*. (p. 52), por W. J. Kraemer, S. J. Fleck, & M. R. Deschmes, 2012, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Copyright 2012 por Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.



NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

- ☐ **CHO, grasas y proteínas**
- ☐ **Vitaminas y minerales**
- ☐ **Hidratación y líquidos**

VITAMINAS Y MINERALES: MITOS Y REALIDADES

Mito: *Las vitaminas proveen energía*

Realidad: *Las vitaminas no contienen calorías*

Mito: *Entre más vitaminas ingieras, en mejor aptitud física te te encontrarás*


Realidad: *El exceso de vitaminas puede afectar la salud*

Mito: *Los alimentos en los supermercados no proveen todas las vitaminas que el cuerpo requiere*

Realidad: *Consumir variedad de alimentos asegura obtener todas las vit. que el organismo humano requiere*

Mito: *Los atletas, en especial los CPLD, necesitan suplementos de vitaminas para mejorar el rendimiento deportivo*

Realidad: *La mayoría de los CPLD elite tienen una mayor ingesta calórica, lo cual asegura un suministro adecuado vit.*



VITAMINAS Y MINERALES

❑ Mito:

- El ejercicio agota las reservas de vitaminas y minerales, de manera que se requiere la suplementación de estos nutrientes

❑ Realidad:

- Con una dieta equilibrada:
el cuerpo satisface las necesidades de estos nutrientes
- Fundamentadas en evidencias científicas:
 - ⇒ Seleccionar una variedad de alimentos naturales:
Garantiza obtención vitaminas/minerales que necesitan
 - ⇒ Atletas con posibles deficiencias de vitaminas y minerales:
Estética, Vegetariano, Hacer un Peso, Comida Chatarra



VITAMINAS Y MINERALES: *Suplementación* ***DEFICIENCIAS: Deportes de Alto Riesgo***

ATLETAS EN PELIGRO DE UNA DEFICIENCIA VITAMÍNICA



AQUELLOS QUE LIMITAN SU CONTENIDO CALÓRICO



**ATLETAS PENDIENTES A UN AUMENTO
COSMÉTICO DE SU PESO CORPORAL**

-  **Gimnastas**
-  **Bailarinas**
-  **Patinadores
Sobre hielo
de figura**
-  **Clavadistas**



**ATLETAS QUE REQUIEREN
CONTROLAR EL PESO (HACER EL PESO)**

-  **Luchadores
olímpicos**
-  **Boxeadores**
-  **Jinetes de
caballos de
carrera**
-  **Jugadores de
“Football” de
peso liviano**
-  **Remo**
-  **Tripulación
de un navío**



Prácticas Dietéticas Pobres/Deficientes

DISCIPLINA DEPORTIVA	CRITERIO
Gimnasia, jinetes, ballet, baile, gimnasia rítmica, patinaje sobre hielo, aeróbicos	Bajo Peso Corporal: Reducido consumo energético crónico para poder alcanzar un bajo porcentaje de grasa
Deportes que se clasifican por su peso (Ej: judo, boxeo, lucha olímpica, remo, salto con esquí)	Peso de Competencia: Dietas para la pérdida radical de peso, con el fin de llegar a la categoría del peso de competencia deseable
Fisiculturistas	Bajo Peso Graso: Pérdida de peso drástico para alcanzar la cantidad más baja de grasa en el organismo
Atletas vegetarianos	Especialmente en eventos de tolerancia

NOTA: Adaptado de: *Nutritional Needs of Athletes*. (p. 8), por F. Brouns, 1993, New York: John Wiley & Sons. Copyright 1993 por John Wiley & Sons Ltd.



VITAMINAS Y MINERALES:

RECOMENDACIÓN: Atletas en General



- **Ingerir una variedad de alimentos, para asegurar una dieta balanceada, con las raciones adecuadas de cada grupo de alimento, según las demandas energéticas de su deporte**
- **No asumir que la supercarga de vitaminas sustituirá la necesidad de un entrenamiento vigoroso**

- Copyright © 2013 Edgar Lopategui Corsino | Saludmed



VITAMINAS Y MINERALES: *SUPLETAMENTACIÓN: Dieta*



- **La suplementación no es necesaria**
- **Seleccionar una variedad de alimentos naturales en las cantidades y calidades adecuadas:**

💠 ***Esto habrá de garantizar:***

Las vitaminas y minerales que necesitan los atletas



NOTA. Adaptado de: "ChooseMyPlate.gov: Getting Started with MyPlate," por United States Department of Agriculture [USDA], 2012. Copyright 2012 por United States Department of Agriculture [USDA]. Recuperado de <http://www.choosemyplate.gov/downloads/GettingStartedWithMyPlate.pdf>

PIRÁMIDA ALIMENTARIA: *PUERTO RICO*

